

PSICOPATOLOGIA ALIMENTARE E SINTOMI DISSOCIATIVI

MACRÌ REBECCA*, VERONICA VANTAGGIATO*, VALENTINA BORGIA**, CATERINA RENNA***

*PSICOLOGO CLINICO PSICOTERAPEUTA • **PSICOLOGO / ONLUS SALOMÈ • INFO@ONLUSSALOME.IT
***PSICHIATRA, CENTRO PER LA CURA E LA RICERCA SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE • DSM - ASL LECCE • CATERINARENNA@GMAIL.COM

INTRODUZIONE

Numerose ricerche hanno rilevato la presenza di sintomi dissociativi in soggetti con Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA) spiegandoli come il risultato di esperienze traumatiche infantili. Attualmente non ci sono studi che indagano il ruolo delle caratteristiche dei Disturbi del Comportamento Alimentare sulla sintomatologia dissociativa.

OBIETTIVI

Lo scopo del presente lavoro è quello di esaminare l’influenza dei sintomi alimentari specifici e aspecifici, valutati tramite Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2, Garner et al,1983) nella sintomatologia dissociativa, valutata tramite il Dissociation Questionnaire (DIS.Q, Vanderlinden et al,1993) in soggetti affetti da Disturbo del Comportamento Alimentare.

METODO

Il campione è costituito da 200 soggetti affetti da Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e Binge Eating Disorder (BED) secondo il DSM 5 che sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale presso il Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DSM, ASL Lecce). La diagnosi di disturbo dell’alimentazione è stata eseguita mediante colloqui psichiatrici e interviste semistrutturate basate sui criteri del DSM 5. A tutti i soggetti sono stati somministrati numerosi strumenti psicometrici tra cui:

EDI-2 Questionario autosomministrato che valuta i sintomi specifici e aspecifici del Disturbo del Comportamento Alimentare e che consiste delle seguenti scale: Impulso alla Magrezza, Bulimia, Insoddisfazione per il Corpo, Inadeguatezza, Insicurezza Sociale, Sfiducia Interpersonale, Consapevolezza Enterocettiva, Impulsività, Perfezionismo, Ascetismo, Paura della Maturità.

DIS-Q Questionario autosomministrato che valuta la sintomatologia dissociativa, che consente di individuare un punteggio totale e un punteggio in 4 sottoscale: Confusione di identità e frammentazione (riferita alle esperienze di derealizzazione o di depersonalizzazione); Perdita di controllo (riferita alle esperienze in cui vi è perdita di controllo su comportamento, pensieri ed emozioni); Amnesia; Assorbimento.

I dati ottenuti sono stati analizzati utilizzando SPSS, ver.21.

RISULTATI

Dall’analisi effettuata attraverso la regressione lineare con il metodo stepwise emerge che la psicopatologia specifica e aspecifica del disturbo alimentare influenza la sintomatologia dissociativa in soggetti con DCA.

Nel campione totale i sintomi specifici che influenzano la sintomatologia dissociativa sono Bulimia e Insoddisfazione per il Corpo mentre quelli aspecifici sono Consapevolezza Enterocettiva e Impulsività.

Nei soggetti con un’età inferiore a 25 anni l’unica differenza rispetto al campione totale è rappresentata dal maggiore peso della sottoscala paura della maturità a discapito dell’impulsività per quel che riguarda la psicopatologia aspecifica mentre quesilla specifica rimane la stessa.

La sottoscala Impulsività insieme a quella della Consapevolezza Enterocettiva sembrerebbe, invece, spiegare maggiormente la presenza di sintomatologia dissociativa nei soggetti con un’età maggiore di 25 anni a discapito della Bulimia e dell’Insoddisfazione Corporea.

CONCLUSIONI

Lo studio suggerisce che sia la psicopatologia specifica che quella aspecifica del Disturbo del Comportamento Alimentare condizionano la presenza e la gravità della sintomatologia dissociativa in soggetti affetti da DCA .

BIBLIOGRAFIA

Garner DM, Olmstead MP, Polivy J (1983). Eating Disorder Inventory-2.
Vanderlinden J, Van Dyck R, Vandereycken W, Vertommen H (1993). The Dissociation Questionnaire: Develpolment and characteristics of a new self--reporting questionnaire, Clinical Psychology and Psychotherapy, 1,21-27.

REGRESSIONE / METODO=STEPWISE: VARIABILE DIPENDENTE: DIS.Q_GSI
VARIABILI INDIPENDENTI: EDI2_DT • EDI2_BU • EDI2_BD • EDI2_IN • EDI2_P • EDI2_ID • EDI2_IA • EDI2_MF • EDI2_ASC • EDI2_IR • EDI» SI

CAMPIONE TOTALE

Riepilogo del modello ^e			
Modello	R	R-quadrato	Errore std. della stima
1	,630 ^a	,397	,394
2	,648 ^b	,420	,414
3	,657 ^c	,432	,423
4	,667 ^d	,445	,433

Variabili immesse/rimosse^a

Modello	Variabili immesse	Variabili rimosse	Metodo
1	EDI2_IA		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).
2	EDI2_BU		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).
3	EDI2_IR		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).
4	EDI2_BD		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).

ANOVA^a

Modello	Regressione	Residuo	Totale	gl	Media quadratica	F	Sign.
1	35,239	53,615	88,853	1	35,239	130,138	,000 ^b
2	37,137	51,716	88,853	2	18,569	71,389	,000 ^c
3	38,400	50,454	88,853	3	12,800	49,724	,000 ^d
4	39,523	49,331	88,853	4	9,881	39,057	,000 ^e

a. Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

b. Predittori (costante), EDI2_IA

c. Predittori (costante), EDI2_IA, EDI2_BU

d. Predittori (costante), EDI2_IA, EDI2_BU, EDI2_IR

e. Predittori (costante), EDI2_IA, EDI2_BU, EDI2_IR, EDI2_BD

Grafico P-P normale di regressione Residuo standardizzato

Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

a. Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

CAMPIONE <= 25 ANNI

Riepilogo del modello ^{e,f}			
Modello	R	R-quadrato	Errore std. della stima
1	,666 ^a	,443	,437
2	,701 ^b	,492	,482
3	,717 ^c	,514	,499
4	,732 ^d	,536	,516

Variabili immesse/rimosse^{a,b}

Modello	Variabili immesse	Variabili rimosse	Metodo
1	EDI2_IA		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).
2	EDI2_BU		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).
3	EDI2_MF		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).
4	EDI2_BD		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).

ANOVA^{a,b}

Modello	Regressione	Residuo	Totale	gl	Media quadratica	F	Sign.
1	18,448	23,198	41,646	1	18,448	78,729	,000 ^c
2	20,485	21,161	41,646	2	10,243	47,436	,000 ^d
3	21,416	20,231	41,646	3	7,139	34,227	,000 ^e
4	22,307	19,339	41,646	4	5,577	27,683	,000 ^f

a. Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

b. Selezione dei soli casi per cui AGE OF PRESENTATION <= 25

c. Predittori (costante), EDI2_IA

d. Predittori (costante), EDI2_IA, EDI2_BU

e. Predittori (costante), EDI2_IA, EDI2_BU, EDI2_MF

f. Predittori (costante), EDI2_IA, EDI2_BU, EDI2_MF, EDI2_BD

Grafico P-P normale di Residuo standardizzato per i casi selezionati

Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

a. Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

CAMPIONE > 25 ANNI

Riepilogo del modello ^{c,d}			
Modello	R	R-quadrato	Errore std. della stima
1	,593 ^a	,352	,345
2	,622 ^b	,387	,374

Variabili immesse/rimosse^{a,b}

Modello	Variabili immesse	Variabili rimosse	Metodo
1	EDI2_IA		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).
2	EDI2_IR		Stepwise (criteri: Probabilità-di-F-da-inserire <= ,050, Probabilità-di-F-da-rimuovere >= ,100).

ANOVA^{a,b}

Modello	Regressione	Residuo	Totale	gl	Media quadratica	F	Sign.
1	16,406	30,213	46,619	1	16,406	52,671	,000 ^c
2	18,040	28,578	46,619	2	9,020	30,301	,000 ^d

a. Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

b. Selezione dei soli casi per cui AGE OF PRESENTATION > 25

c. Predittori (costante), EDI2_IA

d. Predittori (costante), EDI2_IA, EDI2_IR

Grafico P-P normale di Residuo standardizzato per i casi selezionati

Variabile dipendente: DIS.Q_GSI

a. Variabile dipendente: DIS.Q_GSI